

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

65 M 26 JUILLET 1989

## GRANDES CULTURES SEMENCES N.7

### MAIS

(En collaboration avec les SUAD de l'HERAULT, du  
GARD et du SPMS de l'HERAULT)

**Pyrale-Sesamie** : Traitement contre la deuxième génération.

**Acarieus** : Redoubler et vigilance

**Pucerons** : Quasiment absents

### PYRALE ET SESAMIE

Les seconds vols ont débuté vers les 16-18 juillet (Région de Montpellier, plaine d'Arles) et les premières pontes fraîches ont été observées dès le 24 juillet.

### MAIS-SEMENCE

En fonction des zones de culture un ou deux traitements seront à effectuer :

\* Zones sensibles : 2 traitements sont à prévoir pour couvrir la période d'éclosion des pontes. Ce sont celles qui ont subi de fortes attaques de pyrale et/ou de sésamie en première génération.

INTERVENEZ AUX DATES SUIVANTES :

- premier traitement à effectuer vers les 30 juillet - 1er août
- deuxième à réaliser 12 à 15 jours plus tard

\* Zones peu sensibles : 1 seul traitement

~~Il sera réalisé vers les 5 à 7 août.~~

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67.92.41.42



## MAIS CONSOMMATION

Un seul traitement à réaliser vers les 5 à 7 août tout particulièrement en présence de Sésamie en première génération.

Produit de traitement : voir le dépliant de protection du maïs du bulletin du 11 avril 1989

## ACARIENS

Des foyers bien déclarés sont observables sur de nombreuses cultures dont les stades phénologiques vont majoritairement de la pleine à la fin floraison femelle.

Avec les fortes chaleurs de la période, ils peuvent exploser et occasionner des dégâts préjudiciables au rendement jusqu'au stade grain pâteux.

INTERVENIR si nécessaire selon les indications de la note commune du bulletin du 8 juin 1989.

## PUCERONS

Ils sont naturellement très peu présents.

Cependant, surveillez plus attentivement les parcelles ayant reçu un traitement 1ère génération pyrale ou sésamie avec des spécialités liquides.